МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБУ «Россельхозцентр»

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Тамбовской области

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК

№ 11 от 9 октября 2026 г.

Адрес: 392000, Тамбовская область, городской округ город Тамбов, город Тамбов, улица Московская, д. 2 В

тел/факс: (4752) 75-63-60; e-mail: 68@rscagro.ru

Исх. №707 от 9 октября 2026 г.

Озимая совка в осенний период

В осенний период озимая совка - один из основных вредителей, который может принести значительный ущерб для озимых культур.

В Центрально-Черноземном регионе периодически отмечаются вспышки численности озимой совки. На озимых – рапсе, пшенице, тритикале – она достигает 4-8 гусениц/м², что превышает ЭПВ в два раза. Зачастую заселение локально: отмечаются очаги полной гибели культур (разрастание в сутки до 2-3 м), а число вредителей доходит до 50 гусениц/м².

Повышенная численность вредителя в осенний период может обусловлена одновременным вылетом бабочек первого (после диапаузы) и второго поколений.

Погодные условия осени 2026 года в Тамбовской области (тепло с увлажнением) благоприятны для развития гусениц вредителя. Прогнозируется увеличение их численности в особенности на озимых, посеянных по паровым полям.

Гусеницы озимой совки зеленовато-землянистого цвета, с продольными темными полосками проходит шесть возрастов. Гусеницы младших возрастов в ночное время выходят на поверхность и повреждают листья и стебли, часто питаются на сорняках. Основная вредоносность от гусениц старших возрастов, которые находятся в почве, проявляется в том, что они подгрызают растения возле узла кущения, вызывая их гибель.

При продолжительной теплой осени гусеницы озимой совки будут допитываться, что может привести к значительным выпадам растений озимых культур.

Сельхозпроизводителям необходимо организовать обследование посевов озимых культур, при необходимости провести защитные мероприятия инсектицидами, разрешёнными к применению согласно «Реестра пестицидов и агрохимикатов», разрешенных к применению на территории Российской Федерации 2026 г. Обработки проводится в вечернее или ночное время, когда гусеницы активны и находятся на поверхности растений. При проведении обработок необходимо учитывать температурный режим.

За консультацией обращайтесь в филиал по телефону (*4752) 75-63-65*
и районные отделы филиала.
Контактные данные районных отделов размещены на сайте филиала***:***
http: rsc68tambov.ru